

Nuevo

Magdeleine noire N

Variedad de uva de vino.



Origen

La Magdeleine noire es una variedad probablemente muy antigua y que antes se cultivaba en todo el oeste de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Magdeleine noire

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Magdeleine noire está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2025 en la lista A, pero todavía no está clasificada.

Elementos de descripción

[Redacción in curso]

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	149	225	239	178	188	260	233	239	248
Allele 2	149	234	247	188	194	260	235	270	248

Cultivo y habilidades agronómicas

La Magdeleine noire es de vigor medio y presenta un porte semierguido a horizontal. Aunque esta variedad es bastante fértil en poda larga, es poco productiva en poda corta.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 5 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement

Potencial tecnológico


Los racimos de la Magdeleine noire son de tamaño mediano, a veces alados y medianamente compactos. Las bayas son de tamaño mediano y con gran cantidad de pruina. La piel es de grosor medio y la pulpa es jugosa.

Los vinos obtenidos tienen mucho color, una acidez de mediana a baja y un perfil afrutado bastante complejo. Presentan aromas de frutos negros y regaliz, y tienen un buen equilibrio entre grasa y estructura.


En el pasado, la Magdeleine noire también se cultivaba en parras y se utilizaba como uva de mesa debido a su precocidad.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Debido a su maduración precoz, la Magdeleine noire es poco sensible a la podredumbre gris, pero puede ser vulnerable a los ataques de las aves. Esta variedad presenta un alto nivel de tolerancia frente a la flavescencia dorada.



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages oubliés des Pyrénées. Petit catalogue de cépages. , Interreg., 2019, projet Valovitis.
- Le vigneron charentais ou l'art de cultiver la vigne et d'en soigner les produits, Raguenaud, 1847.
- Parentage of Merlot and related winegrape cultivars of southwestern France: discovery of the missing link. Boursiquot et al., 2009.
- La Magdeleine noire des Charentes, génitrice du Merlot et du Cot, (enfin) retrouvée dans un vignoble du bassin Sud-Ouest. O. Yobrégat, 2014, La Grappe d'antan n°99.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*