Candin B

Variedad ornamental para aficionados.

Origen

Esta variedad se obtuvo en 1981 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Candin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Candin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares de color verde claro, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, abierto, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y uno convexo, una pigmentación antociánica nula o muy baja de los nervios, un limbo liso, brillante, fino, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica, con un sabor de moscatel.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	2018
ha	0

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 131	229	247	176	194	238	236	243	271
Allele 2 133	236	260	186	196	252	254	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Candin presenta un vigor medio. Es una variedad con un porte semi-erguido a erguido que puede manejarse en poda larga moderada.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Candin lleva el número 5004.

Potencial tecnológico

Los racimos de Candin son medianos a grandes, poco compactos y las bayas son grandes, con pulpa firme y poco jugosa.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Candin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse.

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados