

Nuevo

Cacaboué B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Saboya.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Cacaboué

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Cacaboué está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2026, en la lista A.

Elementos de descripción

[Redacción in curso]

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	247	182	233	251	248		
Allele 2	149	236	257	186	243	270	256		

Cultivo y habilidades agronómicas

El Cacaboué posee un porte semi-erguido a erguido y un vigor bajo a medio. Esta variedad es moderadamente productiva.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas a 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y compactos. Las bayas son medianas y tienen una piel fina. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es bastante elevado, manteniendo al mismo tiempo una buena acidez. Los vinos que se elaboran son vivos y relativamente neutros a nivel aromático.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Cacaboué no presenta sensibilidad particular al mildiu y al oídio. Por el contrario, es sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*