

Castets N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad del sudoeste (en particular, la margen derecha del valle del Garona) podría ser originaria de Gironde (en los alrededores de Saint-Macaire). Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Gros Cabernet y el Camaraou noir.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Castets

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Castets está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes muy bronceadas y de color anaranjado,
- a las hojas adultas con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto en V, dientes de largo medio en relación a su anchura, de lados convexos, un limbo con mucha hinchazón, brillante y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada y de sabor herbáceo.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	57	37	6	2	6

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	234	239	172	188	246	248	227	239
Allele 2	149	236	243	186	188	248	248	233	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Castets es una variedad vigorosa, poco fértil para la que debe utilizarse la poda larga. Su desborre es muy tardío y posee un porte erguido.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Castets lleva el número 1126.

Fenología

Época de desborre: 14 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes, pero las bayas son de pequeño tamaño. Esta variedad permite elaborar unos vinos de guarda con gran color, relativamente alcohólicos, pero de baja acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es un poco sensible a la podredumbre gris y, sobre todo, al oídio. Por el contrario, tolera bien el mildiu.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*