

Chatus N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad la encontramos en el sur del Macizo Central, en los Alpes (Delfinado, Saboya) y en el norte de Italia (Piamonte).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Chatus

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Chatus está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores con presencia ocasional de un diente en la base, un seno peciolar cerrado con fondo en V y bordes paralelos o superpuestos, dientes medianos y de lados rectilíneos, un limbo alabeado, con bordes ligeramente hacia el envés, con hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1988	2000	2008	2018
ha	60	18	23	57	63

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	238	216	239
Allele 2	135	225	249	191	194	252	240	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Chatus es una variedad bastante fértil y con porte erguido. Se puede manejar en poda larga o corta. El vigor de esta variedad hace posible su implantación en terrenos bastante pobres y secos. El Chatus parece adaptarse bien a los suelos ácidos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Chatus lleva el número 1046. En 2001, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de unos sesenta clones tras las prospecciones realizadas en el sur del Macizo Central y en Italia.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes, pero las bayas son de pequeño tamaño. El Chatus permite elaborar vinos con un color óptimo, bastante ácidos y muy tánicos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Chatus es un poco sensible al mildiu y al oídio.

Fenología


Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varieta di vite. Ministère de l'agriculture italien [página web, consultada en 2020].











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier