

Chenanson N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre la Grenache y la Jurançon.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Chenanson

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Chenanson está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes cortos a medianos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	250	571	605	437

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	188	188	252	248	233	239
Allele 2	149	236	262	191	202	258	254	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Chenanson es una variedad muy fértil que debe podarse en corto. Es preciso intentar controlar la producción, en particular, los primeros años, pues puede presentar síntomas de pardeado y desecado del escobajo (sobre todo, con el SO4). Esta variedad se puede manejar en gobelet y se adapta a los terrenos cálidos y secos.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas pequeñas. Esta variedad permite la obtención de vinos suaves, afrutados, generosos y bastante típicos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Chenanson es poco sensible a la podredumbre gris.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Chenanson lleva el número 602.

Fenología


Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*