

Chenin B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria del Valle del Loira y, probablemente, de Anjou.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Chenin

Sinonimia

En Bulgaria, el Chenin es oficialmente denominado "Shanin". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Chenin está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Italia, Malta, Portugal y República Checa.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o lóbulos ligeramente superpuestos, de dientes medianos de lados convexos, una intensa pigmentación antociánica de los nervios, un limbo con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas que son de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	16594	14199	9552	9054	10042	9777	10085

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	172	188	248	240	233	255
Allele 2	149	229	257	186	194	252	248	247	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Chenin es una variedad vigorosa y fértil con un potencial de producción que depende mucho de la fertilidad agronómica de los suelos donde se cultiva. Es sensible a los golpes de sol. El desborre es precoz y, tras una helada de primavera, los brotes secundarios se muestran muy poco fértiles.

Selección clonal en Francia

Los catorce clones autorizados de Chenin Ilevan los números 220, 278, 416, 417, 624, 880, 982, 1018, 1206, 1207, 1208, 1209, 1286 y 1348.

Se han instalado más de 200 clones en un conservatorio de los viñedos de Anjou desde 1996. Una otra colección-conservatorio de una quincena de clones fue plantado en el departemento de Aveyron en 1995.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano a pequeño. Esta variedad puede producir, según las condiciones de cultivo y según los terruños (calcáreos, esquistos), o bien vinos espumosos o secos, o bien vinos licorosos. El potencial de acidez es importante y los productos obtenidos son elegantes, generalmente bastante vivos, nerviosos, con aromas de miel.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Chenin es especialmente sensible a la podredumbre gris, al oídio y a las enfermedades de madera. Por el contrario, tolera mejor el mildiu, el black rot y la antracnosis.


Fenología

época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas. época de maduración: 2ª época, 3 semanas a 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier