

Courbu B

Variedad de uva de vino.







Origen

El Courbu es una variedad autóctona de los viñedos pirenaicos. No se corresponde con la forma blanca del Courbu noir. Se trata de una variedad diferente.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Courbu

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Gros Courbu» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En España, el Courbu puede denominarse oficialmente «Hondarrabi Zuri».

Datos regulatorios

En Francia, el Courbu está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de España.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color rojo, muy bronceadas,
- a las hojas adultas de gran tamaño, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes cortos respecto a su ancho en la base, de lados convexos, un limbo con gran hinchazón, alabeado o con bordes hacia el envés, ondulado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada y de color verde amarillo o ligeramente rosado al madurar.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	295	142	86	48	44	27

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	182	188	252	248	233	239
Allele 2	149	236	247	188	204	252	248	235	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es sensible al viento. Debe ser empalizada y manejarse en poda larga. Es preferible injertarla en portainjertos de vigor reducido a moderado.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Courbu llevan los números 726, 727 y 812. La conservación de casi 80 clones está garantizada en unas parcelas situadas en Irouleguy y Jurançon (Pirineos Atlánticos).

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños y las bayas son muy pequeñas. Esta variedad permite obtener unos mostos ricos en azúcares y moderadamente ácidos. Se puede utilizar para elaborar vinos licorosos muy finos o vinos secos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


Esta cepa no muestra sensibilidad particular salvo a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier