Dabouki B

Variedad de uva de mesa.

Origen

Esta variedad de uva de mesa de origen natural está muy expandida en Oriente Próximo.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Dabouki

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Dabouki está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de otros países miembros de la Unión Europea: España y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares, de gran tamaño, de cinco, siete o más de siete lóbulos, con senos laterales con fondo en U o plano, un seno peciolar poco abierto o cerrado con fondo en U, dientes grandes, de largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica intensa de los nervios, un limbo con hinchazón marcada, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media a alta de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	23	56	202	101	20	17	6.2

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 133	232	247	176	188	248	240	257	249
Allele 2 149	234	249	180	204	248	244	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Dabouki es una variedad vigorosa, con porte horizontal y un potencial de producción medio. Se puede manejar en poda corta o larga moderada. El Dabouki tolera bien la sequía y es poco sensible a la corredura y al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Dabouki lleva el número 1103.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes a muy grandes y moderadamente compactos. Las bayas también son muy grandes, con piel gruesa y pulpa carnosa de sabor simple. Esta variedad posee una aptitud óptima para la conservación y el transporte.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

En condiciones de humedad, el Dabouki muestra sensibilidad al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris.

Fenología

Época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 5 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados