Danam B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Dabouki y el Muscat de Hambourg.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Danam

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Danam está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, abierto con bordes paralelos, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo con hinchazón intensa, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1988	2000	2018
ha	3	1	0

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 147	229	249	180	186	240	244	235	271
Allele 2 149	232	249	182	188	248	254	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Danam posee un vigor moderado a elevado y suele manejarse en poda corta. Es poco sensible a la corredura y al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Danam lleva el número 498.

Potencial tecnológico

Los racimos son muy grandes. Las bayas también son muy grandes, con piel gruesa y pulpa de sabor simple. El potencial de rendimiento es elevado y la aptitud para el transporte bastante aceptable.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Danam es poco sensible a la podredumbre.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados