Dattier de Beyrouth B

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad de uva de mesa de origen natural está presente en numerosos países.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Dattier de Beyrouth

Sinonimia

En la Unión Europea, el Dattier de Beyrouth es oficialmente denominado con otros nombres: Afuz Ali (Croacia, Hungría, Rumanía), Bolgar (Bulgaria), Roseti (España) y Rozaki (Grecia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Dattier de Beyrouth está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Croacia, España, Grecia, Hungría, Portugal y Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos largos,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, orbiculares, de tres a cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, de bordes paralelos y con fondo en U ocasionalmente limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes pequeños a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo liso, brillante y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica larga o cilíndrica.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1508	1591	5695	191	42	49	24

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	186	244	248	233	257
Allele 2	133	229	249	182	188	252	254	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Dattier de Beyrouth es una variedad vigorosa, con un porte semi-erguido u horizontal. Se puede manejar en poda corta o larga, pero debe ser empalizado cuidadosamente pues la base de los pámpanos es frágil en primavera y son sensibles al viento. El Dattier de Beyrouth también es sensible a la corredura y al millerandaje.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Dattier de Beyrouth llevan los números 304, 966 y 1223.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes a muy grandes, abiertos o moderadamente compactos. Las bayas son muy grandes, con piel gruesa y pulpa carnosa de sabor simple. Esta variedad presenta una aptitud óptima para la conservación y el transporte.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Dattier de Beyrouth es muy sensible al mildiu y a la excoriosis. Es también sensible a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados