

Abouriou N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est probablement originaire du Lot-et-Garonne (environs de Villérial). Il a été signalé à la fin du XIXème siècle par Numa Naugé.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Abouriou

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Abouriou est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés avec une distribution de la pigmentation anthocyanique en liseré,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux assez profonds, un sinus pétiolaire en lyre ouvert, des dents de longueur moyenne, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe bullé et tourmenté et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 908 | 898 | 369 | 539 | 488 | 474 | 319 |

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 131 | 234 | 247 | 178 | 194 | 252 | 240 | 233 | 239 |
| Allele 2 | 149 | 234 | 247 | 182 | 204 | 260 | 248 | 243 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Par sa précocité, sa fertilité (possibilité de tailler court) et sa vigueur modérée, ce cépage se montre bien adapté aux conditions difficiles, marginales et limites au niveau climatique.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés d'Abouriou portent les numéros 603 et 604. Un conservatoire d'une cinquantaine de clones a été planté en 2006 dans le Lot-et-Garonne.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne ainsi que les baies. Ce cépage donne des vins très colorés, charpentés, assez tanniques mais manquant d'acidité.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Abouriou est relativement peu sensible aux maladies et résiste assez bien à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*