

# Ganson N

# Variété de raisin de cuve.



### Origine

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant le Grenache et le Jurançon.

### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

### Nom de la variété en France

Ganson

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

### Données règlementaires

En France, le Ganson est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou à cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire fermé ou à lobes chevauchants, des dents petites, courtes à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle et, à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|
| ha    | 30   | 12   | 6    | 4.9  |

# Profil génétique

| MicrosatelliteVVS2 |     | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1           | 135 | 223   | 239   | 188    | 188     | 258     | 248    | 243    | 239    |
| Allele 2           | 149 | 236   | 243   | 191    | 196     | 260     | 254    | 245    | 239    |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété, assez précoce, présente un port érigé et une fertilité suffisante pour être taillée court et conduite en gobelet. Sa production est régulière.

### Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Ganson porte le numéro 534.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

## Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Ganson donne des vins fins mais peu colorés et peu typés.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Ganson est peu sensible à la pourriture grise.

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier