

Jacquère B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage autochtone de la Savoie est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Jacquère

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, la Jacquère est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes avec un sinus pétiolaire en V ouvert, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe involuté et, à la face inférieure, une densité faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| ha | 1362 | 1491 | 855 | 995 | 1104 | 1079 | 920 |
|----|------|------|-----|-----|------|------|-----|

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 176 | 196 | 244 | 240 | 227 | 239 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 2 | 141 | 232 | 249 | 178 | 204 | 252 | 254 | 245 | 271 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Aptitudes culturales et agronomiques

La Jacquère est un cépage assez fertile, régulièrement productif et de vigueur moyenne. Il doit être de préférence taillé court. La Jacquère se montre bien adaptée aux terroirs argilo-calcaires et aux éboulis caillouteux.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. La Jacquère permet d'obtenir des vins pâles, légers (discrètement floraux), vifs (acides, mais avec une fraîcheur agréable), souvent 'perlants' et destinés à être consommés assez rapidement.

Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés de Jacquère portent les numéros 569, 658, 769, 788 et 923. Un conservatoire de plus de 70 clones a été planté en Savoie en 2015.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage se montre sensible au black rot et à la pourriture grise mais résiste mieux au mildiou et à l'oïdium.


Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*