

# Jacquère B

## Variété de raisin de cuve.







## Origine

Ce cépage autochtone de la Savoie est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

#### Nom de la variété en France

Jacquère

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données règlementaires

En France, la Jacquère est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes avec un sinus pétiolaire en V ouvert, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe involuté et, à la face inférieure, une densité faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

## **Evolution des surfaces cultivées en France**

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1362	1491	855	995	1104	1079	920

## Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	196	244	240	227	239
Allele 2	141	232	249	178	204	252	254	245	271

Potentialités technologiques

consommés assez rapidement.

l'oïdium.

Les grappes et les baies sont moyennes. La Jacquère

permet d'obtenir des vins pâles, légers (discrètement

floraux), vifs (acides, mais avec une fraîcheur

agréable), souvent 'perlants' et destinés à être

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage se montre sensible au black rot et à la

pourriture grise mais résiste mieux au mildiou et à

## Aptitudes culturales et agronomiques

La Jacquère est un cépage assez fertile, régulièrement productif et de vigueur moyenne. Il doit être de préférence taillé court. La Jacquère se montre bien adaptée aux terroirs argilo-calcaires et aux éboulis caillouteux.

## Sélection clonale en France


Les cinq clones agréés de Jacquère portent les numéros 569, 658, 769, 788 et 923. Un conservatoire de plus de 70 clones a été planté en Savoie en 2015.

## Phénologie


Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

## Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier