

Joubertin N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire de l'Isère. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, le Joubertin serait issu d'un croisement entre le Persan et le Peloursin.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Joubertin

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Joubertin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, orbiculaires, à sept ou neuf lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe légèrement révoleté, bullé, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
ha	172	158	8	2	0.4

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	229	257	182	188	240	240	233	249
Allele 2	149	236	257	186	194	248	262	235	251

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Joubertin est un cépage modérément fertile. Il peut être conduit en taille longue ou courte et il a tendance à émettre beaucoup de rejets et de gourmands. Ce cépage s'adapte bien aux sols argileux et relativement compacts.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. Le Joubertin permet d'élaborer des vins très colorés, corsés, mais un peu acides. Le potentiel d'accumulation des sucres de ce cépage est limité.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Joubertin porte le numéro 1320.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Joubertin ne présente pas de sensibilité particulière aux principales maladies.

Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*