

Jurançon noir N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage semble être originaire du Sud-Ouest de la France. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, le Jurançon noir serait issu d'un croisement entre la Folle blanche et le Cot.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Jurançon noir

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Dame noire" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. A Chypre, le Jurançon noir peut officiellement être désigné par le nom "Dame noir".

Données réglementaires

En France, le Jurançon noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de Chypre.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de couleur vert foncé, à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux profonds, ouverts, à fond en U, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé à fond parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe plan, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	12325	12099	7035	3789	1934	1122	395

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	232	239	186	196	252	238	233	239
Allele 2	149	236	262	188	202	260	248	245	251

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage fertile à port érigé est productif. Les jeunes vignes sont souvent vigoureuses mais peuvent s'affaiblir rapidement sous l'effet de la surproduction. C'est pourquoi il faut veiller à maîtriser les rendements par une taille courte. C'est un cépage à cycle relativement court (ce qui peut présenter un intérêt pour des zones limites), régulier en production et facile à cultiver.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Jurançon noir portent les numéros 438 et 571. Un conservatoire d'une soixantaine de clones a été planté dans le Lot en 2012.

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Jurançon noir permet d'obtenir des vins peu ou moyennement alcooliques et de couleur peu intense. Ce sont des vins légers, simples, à boire rapidement. Le Jurançon noir permet également d'élaborer des vins rosés vifs et fruités.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Jurançon noir se montre sensible à la pourriture grise mais est peu atteint par les maladies du bois.

Debourement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*