

Len de l'Œil B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire de la région de Gaillac.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Len de l'Œil

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Loin de l'Œil" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Len de l'Œil est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux rameaux avec des entre-nœuds longs,
- aux feuilles adultes à cinq, sept ou neuf lobes avec un sinus pétiolaire ouvert à fond en U, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté et tourmenté et, à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	112	137	472	598	747	708	638
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	131	223	247	182	188	250	238	233	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	137	236	257	188	188	252	248	247	255
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

C'est un cépage assez vigoureux et productif, dont le nom (loin de l'oeil) provient du rang moyen d'insertion de la première inflorescence sur le rameau qui est assez élevé (en moyenne au niveau du sixième noeud) ou du pédoncule de la grappe qui est long.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Len de l'EI porte le numéro 733. Un conservatoire d'environ 90 clones a été implanté dans le vignoble de Gaillac (Tarn) en 1998.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies moyennes. Ce cépage permet d'obtenir des vins secs, fins, parfumés mais peu acides. En sur-maturation, le Len de l'EI peut permettre d'obtenir des vins moelleux concentrés.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Len de l'EI est sensible à la pourriture grise et aux acariens.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*