

Mérille N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire du Sud-Ouest (Tarn et Garonne).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Mérille

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, la Mérille est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, à trois ou cinq lobes, avec une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe fortement bullé, plissé près du point pétiolaire, ondulé entre les nervures principales, révoluté, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	2422	2458	622	226	105	80	24

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	232	239	182	194	240	248	235	239
Allele 2	149	236	247	188	194	260	254	243	251

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage assure une production régulière et avec une taille longue, les rendements sont élevés.

Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Mérille portent les numéros 444, 445 et 790.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont très grosses et les baies sont grosses. La Mérille permet d'obtenir des vins légers (faible potentiel en sucre) et assez ordinaires.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sujet au mildiou et à l'oïdium. Il est un peu sensible à la pourriture grise et davantage aux acariens, vers de la grappe et cicadelles.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier