Meslier Saint-François B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.







Origine

Ce cépage originaire de l'Ouest de la France résulterait d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Gouais blanc et le Chenin.

Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

Nom de la variété en France

Meslier Saint-François

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Gros Meslier" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Meslier Saint-François est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, de couleur vert foncé, entières ou à cinq lobes avec des sinus latéraux peu profonds à fond en U, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe épais, légèrement involuté et tourmenté, bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés et une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	2336	1851	589	221	60	30	8

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	239	172	188	238	238	227	271
Allele 2	131	232	239	176	196	248	240	233	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à débourrement précoce craint les gelées de printemps. Le Meslier Saint-François est un cépage fertile mais de vigueur faible à modérée.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Meslier Saint-François porte le numéro 1325.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Ce cépage donne des vins peu alcooliques, assez plats et légers. Les eaux-de-vie obtenues à partir de ses vins sont fines et ont du bouquet.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sensible au black rot et au mildiou. En revanche, il se montre assez sensible à l'oïdium et très sensible à la pourriture acide.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés