

# Arinarnoa N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1956. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, serait issue d'un croisement entre le Tannat et le Cabernet-Sauvignon.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Arinarnoa

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Arinarnoa est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec un sinus pétiolaire à fond souvent limité par la nervure près du point pétiolaire, et à la face inférieure, un limbe avec une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies de forme arrondie à saveur herbacée.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2008	2018
ha	5	155	164	178

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	229	239	172	188	240	248	233	239
Allele 2	153	238	249	182	194	248	254	233	239

### Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété, à débourrement très tardif, se vendange bien à la machine. Sa vigueur est moyenne et sa production régulière.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Arinarnoa porte le numéro 723.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 15 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie à 4 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. Le vin est bien structuré (acidité et alcool), coloré et tannique, avec des arômes complexes et persistants.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Arinarnoa résiste bien à la pourriture grise (grappes lâches et pellicules épaisses) et se conserve bien sur souche.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*