

Noir Fleurien N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire d'Auvergne est d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Noir Fleurien

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Noir Fleurien est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou pentagonales, à cinq lobes, avec des sinus latéraux supérieurs profonds, un sinus pétiolaire à bords parallèles ou à lobes chevauchants, des dents moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe légèrement involuté, plissé près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|
| | | | |
| ha | 6 | 0.2 | 0.1 |

Profil génétique

| Microsatelli | teVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 178 | 188 | 238 | 238 | 227 | 263 |
| Allele 2 | 141 | 238 | 255 | 191 | 204 | 252 | 254 | 259 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Noir Fleurien est un cépage à port érigé, vigoureux, adapté aux terroirs assez secs et calcaires.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage. Un conservatoire d'une trentaine de clones a été implanté en 2000 dans le vignoble d'Auvergne (Massif Central).

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies petites. Le Noir Fleurien permet d'élaborer des vins colorés, équilibrés et agréables.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Noir Fleurien ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux maladies.

Phénologie


Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France. ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier