

Oberlin noir N

Variété de raisin de cuve.



Origine

L'Oberlin noir (hybride interspécifique) provient d'un croisement entre le Gamay et *Vitis riparia*.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Oberlin noir

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "595 Oberlin" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, l'Oberlin noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau demi-ouverte qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes cunéiformes, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en U ouvert à peu ouvert, parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, un limbe finement bullé, gaufré près du point pétiolaire, et à la face inférieure une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	2000	2008	2018
ha	4500	2903	68	64	62

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	186	187	246	238	216	239
Allele 2	157	263	253	214	194	258	266	235	239

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Oberlin noir est une variété vigoureuse et fertile avec un port demi-érigé qui doit être conduite en taille longue.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : précoce, 1 demi-semaine avant le Chasselas.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes, peu compactes et les baies sont petites. Le potentiel d'accumulation des sucres de cette variété est très bon. L'Oberlin noir permet d'élaborer des vins de qualité très moyenne, très colorés, avec présence d'anthocyanes diglucosides.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Oberlin noir résiste bien au mildiou et à l'oïdium. Il doit de préférence être greffé.
En dépit des tolérances décrites, une protection fongicide minimale est nécessaire pour protéger suffisamment la végétation et la vendange, notamment lors des millésimes où la pression des maladies est forte.



