

Abondant B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété cultivée dans l'Est de la France a été sélectionnée par A. Wanner. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre la Madeleine royale et le Kövidinka.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Abondant

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Abondant est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel:

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes de grande taille, entières avec un sinus pétiolaire peu ouvert à bords parallèles ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe légèrement gaufré, plissé près du point pétiolaire, bullé, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
ha	21	14	3	2	0.8

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	225	247	178	194	246	248	216	251
Allele 2	149	238	249	184	194	252	254	247	271

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Abondant est une variété vigoureuse, fertile en taille courte. Son débourrement précoce l'expose aux gelées de printemps.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes à grosses. L'Abondant donne des vins blancs assez neutres et ordinaires.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Abondant porte le numéro 1376.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


L'Abondant est sensible à la pourriture grise.

Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Debourement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*