

Perdea B

Variété de raisin de cuve.







Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1954 à partir d'un croisement entre le Raffiat de Moncade et le Chardonnay.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Perdea

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Perdea est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes à moyennes par rapport à leur largeur à la base à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan, lisse et, à la face inférieure, une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1988	2000	2008	2018
ha	3	3	9	3	1.9

Profil génétique

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	243	186	188	246	240	227	239
Allele 2	141	238	249	186	188	252	254	233	271

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont petites à

blancs secs agréables et de qualité. Ce sont des vins

moyennes. Le Perdea permet d'élaborer des vins

généralement parfumés et suffisamment acides.

Le Perdea est peu sensible à la pourriture grise.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété possède une bonne vigueur. Elle peut être conduite en taille longue modérée et il est préférable de la palisser même si elle a un port assez érigé. Elle est parfois un peu sensible au millerandage mais permet cependant d'obtenir de bons rendements.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Perdea porte le numéro 742.

Phénologie


Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier