

Plant droit N

Variété de raisin de cuve.







Origine

Ce cépage est vraisemblablement originaire de la haute vallée de la Durance.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Plant droit

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Espanenc" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Plant droit est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de Chypre.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants avec présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	172	337	192	171	33	20	8

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	223	233	182	200	252	248	247	239
Allele 2	149	234	249	191	204	258	262	257	251

Potentialités technologiques

colorés.

Les grappes et les baies sont moyennes à grosses. Le

Plant droit donne des vins d'assez faible degré et peu

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Plant droit est très sensible à la pourriture grise.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à port érigé est bien adapté à la conduite en gobelet. Il est assez productif et fertile. Il résiste à la sécheresse et se montre peu sensible à la brunissure.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Plant droit porte le numéro 1173. Des prospections ont été menées récemment dans les vignobles de Provence.

Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier