

Portugais bleu N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage semble être d'origine autrichienne.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Portugais bleu

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Portugais bleu est officiellement désigné par d'autres noms : Blauer Portugieser (Allemagne, Autriche), Kékoportó (Hongrie), Modry Portugal (Rép. Tchèque, Slovaquie), Oporto (Roumanie), Portoghese (Italie), Portugalka (Slovénie), Portugizac (Croatie) et Português Azul (Portugal). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes entières, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe mince fragile, involuté, tourmenté, parfois gaufré, brillant, uni, et à la face inférieure, une densité nulle des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Données réglementaires

En France, le Portugais bleu est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Croatie, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1988	1998	2008	2018
ha	1042	1040	945	270	87	14

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	243	178	188	250	248	227	251
Allele 2	149	229	255	191	204	260	248	259	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Portugais bleu est un cépage très précoce, vigoureux, particulièrement sensible au vent. Il est adapté aux zones climatiques fraîches. Le Portugais bleu est cependant assez sensible aux froids de l'hiver et sa précocité de débourrement l'expose aux gelées de printemps. Il convient aux terrains sablonneux et aux terroirs assez secs et pauvres.


Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Portugais bleu porte le numéro 939. Un conservatoire d'une quarantaine de clones a été implanté en 2000 dans le vignoble d'Auvergne (Massif Central).


Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 demi-semaine après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*