

# Aubin vert B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage originaire du Nord-Est de la France (Lorraine) résulterait, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Gouais blanc et le Pinot.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Aubin vert

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Aubin vert est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes à trois lobes avec un sinus pétioinaire en V ou à bords parallèles, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe légèrement ondulé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou obovoïde.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

## Profil génétique

	Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	239	176	188	238	248	227	239	
Allele 2	149	232	243	186	196	246	254	235	271	

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aubin vert est un cépage assez fertile et productif que l'on doit tailler modérément.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé pour ce cépage. Des prospections ont été menées récemment dans les vignobles du Nord-Est.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. L'Aubin vert donne des vins communs, peu alcooliques et relativement acides.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


L'Aubin vert ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux maladies.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.

### Débourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
  - Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- 



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*