

Aubun N

Variété de raisin de cuve.



Origine

L'Aubun semble être originaire du Vaucluse.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Aubun

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Murescola" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. Dans l'Union européenne, l'Aubun peut officiellement être désigné par d'autres noms : Caricagiola (Italie), Castelina (Espagne) et Corvo (Portugal).

Données réglementaires

En France, le Aubun est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays de l'Union européenne : Italie et Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux à base en U avec présence assez fréquente d'une dent au fond, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents moyennes à cotés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique moyenne des nervures, un limbe révoluté, ondulé entre les nervures, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou obovoïde.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1664	3284	5822	3664	1724	912	247

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	253	176	194	252	240	243	239
Allele 2	131	234	257	191	200	252	248	257	261

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aubun a un port demi-érigé. C'est un cépage fertile et assez rustique.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés d'Aubun portent les numéros 168 et 350. Un conservatoire de 3 clones a été planté en 2001 dans le Vaucluse.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie à 4 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. En conditions fertiles, ce cépage a beaucoup de mal à se colorer et les degrés sont faibles. En rouge, les vins obtenus sont généralement ordinaires et sans finesse, mais ce cépage peut donner des rosés agréables.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage se montre peu sensible à la pourriture grise et à l'oïdium. En revanche sa sensibilité au mildiou et aux cicadelles est assez grande.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Corse, 2016, San Giuliano, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*