

Segalin N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1957 à partir d'un croisement entre le Jurançon noir et le Portugais bleu.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Segalin

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Segalin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de couleur vert foncé, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux à fond en U, un sinus pétiolaire en U, fermé ou à lobes légèrement chevauchants, à fond parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents courtes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan ou involuté, bullé et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2008	2018
ha	15	65	72	58

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	255	178	202	260	238	233	239
Allele 2	149	232	262	188	204	260	248	259	251

Aptitudes culturales et agronomiques

En conditions méridionales, le Segalin est peu vigoureux. Il est mieux adapté aux zones plus tempérées où il peut être conduit en taille longue modérée et palissé. Le Segalin est sensible au dessèchement de la rafle et à la carence en magnésium, en particulier lorsqu'il est greffé sur SO4.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes alors que les baies sont très petites. Le Segalin donne des vins très colorés, charpentés et tanniques.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Segalin n'est pas trop sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Segalin porte le numéro 745.

Phénologie


Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*