

Sylvaner B

Variété de raisin de cuve.







Origine

Ce cépage semble être originaire d'Europe centrale (Autriche). D'après des analyses génétiques publiées, il serait issu d'un croisement entre le Savagnin et l'Österreichisch Weiß.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Sylvaner

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes brillantes, orbiculaires, entières, avec un sinus pétiolaire peu ouvert, à bords parallèles ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies de forme arrondie.

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Sylvaner est officiellement désigné par d'autres noms : Grüner Silvaner (Allemagne), Silvanac zeleni (Croatie), Silvanske zelené (Rép. Tchèque, Slovaquie), Sylvaner verde (Italie), Zeleni silvanec (Slovénie) et Zöld szilvani (Hongrie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Sylvaner est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 2489 | 2830 | 2644 | 2617 | 2168 | 1603 | 945 |

Profil génétique

| MicrosatelliteVVS2 | | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 149 | 223 | 243 | 186 | 188 | 250 | 240 | 227 | 271 |
| Allele 2 | 151 | 229 | 247 | 191 | 204 | 252 | 248 | 235 | 271 |

Potentialités technologiques

la pourriture grise.

Les grappes sont petites et les baies sont petites à

arômes délicats. Dans des conditions favorables et

avec des rendements maîtrisés, il peut donner des

vins avec d'avantage d'ampleur et de complexité.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

moyennes. Le Sylvaner donne des vins assez vifs aux

Le Sylvaner est très sensible à l'oïdium, au mildiou et à

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Sylvaner est un cépage qui assure une production régulière. Il est cependant assez sensible aux gelées de printemps et d'hiver et ses bois ont parfois du mal à s'aoûter. Le Sylvaner ne convient pas aux terroirs trop chlorosants.

Sélection clonale en France


Les deux clones agréés de Sylvaner portent les numéros 50 et 487. Un conservatoire d'environ 300 clones a été installé en Alsace en 1990.

Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier