

# Bachet N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage originaire du Nord-Est de la France (Aube) résulterait, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Gouais blanc et le Pinot.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Bachet

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Bachet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes entières avec un sinus pétiolaire ouvert, en V ou en U, des dents moyennes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe involuté, parfois légèrement révoluté sur les bords, finement bullé et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1979	1988	2018
ha	1	4	1	0

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	232	243	176	188	238	248	227	271
Allele 2	149	236	249	186	204	246	254	235	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage de bonne vigueur est assez productif. Il paraît bien résister aux gelées hivernales. En revanche, il est sensible à la chlorose et redoute aussi bien la sécheresse que l'asphyxie racinaire.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont de petite taille. Le Bachet donne des vins assez communs, à la fois relativement alcooliques et acides, avec un caractère herbacé.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Bachet est sensible aux principales maladies : mildiou, oïdium et pourriture grise.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine à 1 semaine et demie après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*