

Terret gris G

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété correspond à la mutation grise du Terret noir.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Terret gris

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Terret-Bourret" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Terret gris est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Croatie.

Éléments de description

La description correspond à celle du Terret noir à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui est grise et aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	15017	13384	8987	6191	214	131	40
----	-------	-------	------	------	-----	-----	----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Terret gris présente des aptitudes comparables à celles du Terret noir. Il se montre également assez sensible à la brunissure.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Terret gris porte le numéro 1219. Des travaux de sélection sont en cours suite à des prospections menées dans le vignoble de l'Hérault. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans l'Hérault en 2003.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie à 5 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Terret gris donne des vins neutres et de faible degré.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement du Terret gris vis-à-vis des maladies est comparable à celui du Terret noir.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*