

Terret noir N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Terret noir est d'origine languedocienne.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Terret noir

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Terret noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à trois lobes, des sinus latéraux supérieurs à base en U et à lobes chevauchants, avec un sinus pétioinaire peu ouvert ou fermé à lobes chevauchants, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	131	151	1149	808	623	273	65

Profil génétique

	Microsatellite VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Terret noir possède un port érigé. Il est bien adapté à la conduite en gobelet ou en cordon.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Terret noir porte le numéro 1084.

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. Le Terret noir donne des vins légers, peu alcooliques et peu colorés.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Terret noir est assez sensible au mildiou et à l'oïdium. Il est également sensible aux maladies du bois.

Débourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*