

Tourbat B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage semble être originaire de Catalogne mais il se retrouve également en Sardaigne.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Tourbat

Synonymie

En Italie, le Tourbat est officiellement dénommé "Torbato". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Tourbat est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes entières, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes chevauchants ou très chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, révoluté et, à la face inférieure, une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	112	141	10	14	20	33	32
----	-----	-----	----	----	----	----	----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	141	229	243	176	186	248	254	235	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	238	249	178	188	252	254	257	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Tourbat possède un port un peu retombant et buissonnant. La taille courte lui convient et il doit être implanté dans des sols chauds et secs. Il est par ailleurs un peu sensible à la carence en magnésium.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses, assez lâches, et les baies sont moyennes à grosses. Le Tourbat conserve généralement une bonne acidité à maturité. Il donne des vins légèrement aromatiques, qui ont du corps.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Tourbat portent les numéros 911 et 987.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Tourbat est assez sensible à l'oïdium, aux thrips et aux cicadelles.

Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*