

Valensi noir N

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété de raisin de table paraît être originaire d'Espagne ou du Sud de la France.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Valensi noir

Synonymie

En Espagne, le Valensi noir est officiellement dénommé "Valenci Tinto". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Valensi noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert, à fond en U, des dents petites à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible ou moyenne, un limbe finement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une densité nulle des poils couchés et une densité faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	73	82	159	105	22	18	3.1
----	----	----	-----	-----	----	----	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	135	225	239	178	188	244	254	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	141	234	243	186	196	248	254	259	255
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Valensi noir est une variété de forte vigueur avec un port demi-érigé qui doit être conduite en taille longue.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Valensi noir sont grosses, avec un pédoncule long et peu lignifié. Les baies sont moyennes à grosses, avec une forte pruline. La pulpe est juteuse à saveur simple.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Valensi noir est peu sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*