Victoria B

Variété de raisin de table.







Origine

Cette variété de raisin de table a été obtenue en 1964 en Roumanie par V. Lepadatu et Condei en croisant le Cardinal par le Dattier de Beyrouth.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Victoria

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Victoria est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Autriche, Bulgarie, Italie et Roumanie.

Éléments de description

L'identification fait appel:
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité nulle des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés de couleur verte,
- aux feuilles adultes cunéiformes, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire ouvert et à fond en U, des dents grosses, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe bullé, tourmenté, et face inférieure, une densité nulle des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2018
ha	0

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	239	182	186	244	254	233	251
Allele 2	133	234	249	182	188	252	254	267	257

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Victoria possède une forte vigueur et a un port demi-érigé. C'est une variété qui doit être palissée et qui peut être conduite en taille courte ou en taille longue.

Potentialités technologiques

Les grappes du Victoria sont moyennes à grosses, moyennement compactes et de belle présentation. Les baies sont grosses à pellicule épaisse et à pulpe juteuse.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Victoria portent les numéros 6009 et 6010.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Victoria est peu sensible à la pourriture grise.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Registro nazionale delle varieta di vite. Ministère de l'agriculture italien [site web, consulté en 2020].

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

©2023 Plantgrape, tous droits réservés