

Beaugaray N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA et la SICAREX Beaujolais dans les années 1980 et provient d'un croisement entre le Gamay et le Heroldrebe.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Beaugaray

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Beaugaray est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2014 sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert jaunâtre, à plages bronzées, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur rouge violacé sur la face dorsale, avec des nœuds aplatis et des bourgeons avec une forte pigmentation anthocyanique des écailles,
- aux feuilles adultes pentagonales, entières ou à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétioinaire fermé, à lobes très chevauchants, des dents courtes par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan, bullé, gaufré, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés et une densité nulle des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

	Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	178	194	246	238	216	249	
Allele 2	141	238	249	186	204	260	254	259	271	

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Beaugaray est assez vigoureux, moyennement fertile et a un port demi-érigé. Cette variété peut être sujette au millerandage.


Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Beaugaray porte le numéro 1269.


Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Débourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*