

Roditis Rs

Variété de raisin de cuve.







Origine

Ce cépage est originaire de Grèce.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Roditis

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Roditis est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2015 sur liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Chypre et Grèce.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vertes plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds qui peuvent présenter des stries rouges,
- aux feuilles adultes moyennes à grandes, avec trois ou parfois cinq lobes, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents de longueur moyenne à longue par rapport à leur largeur base, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures partielle, un limbe très brillant, involuté, lisse ou légèrement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année 2018
ha 0

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	194	240	238	235	251
Allele 2	143	225	249	191	202	252	240	247	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Roditis est un cépage vigoureux, productif et au port érigé. Il est tolérant à la sécheresse et il est préférable de le cultiver dans des sols légers et calcaires. S'il est cultivé dans des sols fertiles et profonds le Roditis pourra donner des rendements importants. Il est parfois sujet à la coulure ou au millerandage.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Roditis porte le numéro 1254.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines à 5 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Roditis sont moyennes à grosses et moyennement compactes. Les baies sont moyennes à grosses, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe juteuse. La couleur des baies est liée au rendement, plus ils seront élevés, plus les raisins seront verts. Les vins issus du Roditis sont équilibrés mais peu aptes au vieillissement. Les arômes typiques de ce cépage sont la pêche, l'abricot, les fruits tropicaux, la pomme et la banane.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Roditis est très sensible au mildiou, un peu moins à l'oïdium et à l'excoriose.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Ampélographie hellénique. B. Krimbas, 1943, Grèce.
- Plaquettes Hellenifera. K. Bakasietas, S. Petropoulos et G. Tavaditis, 2019, Grèce.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Angleterre.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier