

Robin noir N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est autochtone du vignoble alpin. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, le Robin noir serait issu d'un croisement entre la Mondeuse blanche et le Tressot.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Robin noir

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Salagnin" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Robin noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2015 sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur verte, à liseré carminé, qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles brillantes, de couleur verte à plages bronzées, avec une densité très faible à faible des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes cunéiformes ou orbiculaires, entières, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux supérieurs moyennement profonds et étroits, un sinus pétiolaire en V ou en U ouvert, des dents petites à moyennes de longueur moyenne à longue par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, bullé, légèrement gaufré et parfois plissé au point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique ou parfois arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

1

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	194	256	238	216	239
Allele 2	137	229	260	186	200	260	240	257	261

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Robin noir est un cépage vigoureux, productif et au port demi-érigé à érigé. Il peut parfois être sujet au millerandage.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Robin noir sont petites à moyennes, souvent ailées et compactes. Les baies sont de taille moyenne, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe juteuse. Les baies ont un bon potentiel d'accumulation en sucre mais sont peu acides. Le Robin noir produit des vins colorés et tanniques qui sont aptes au vieillissement.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Robin noir est très sensible au mildiou, mais il est peu touché par l'oïdium.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.

- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*