

# Voltis B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

La variété Voltis a été obtenue par l'INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le Villaris et un descendant de *Muscadinia rotundifolia*.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Voltis

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Voltis est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2018 sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau à liseré carminé qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte, avec une densité moyenne des poils couchés à la face inférieure,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, orbiculaires, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire en V ouvert, des dents courtes à moyennes par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe dur, brillant, plan ou involuté, bullé, faiblement gaufré, et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie avec présence d'assez nombreuses lenticelles.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

1.7

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	178	194	246	238	243	239
Allele 2	149	248	249	182	200	252	248	247	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

La variété Voltis est vigoureuse et a un port demi-érigé à érigé. Elle est peu à moyennement fertile et doit être conduite en taille longue. Les rameaux du Voltis sont un peu sensibles à la casse au niveau des nœuds et il peut être sujet à la carence en magnésium et en potassium.


### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Voltis porte le numéro 1266.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 12 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

### Debourrement




### Potentialités technologiques

Les grappes du Voltis sont de taille moyenne et moyennement compactes. Les baies sont également de taille moyenne, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe moyennement juteuse.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Voltis est résistant au mildiou et à l'oïdium, mais il est sensible au black rot.  
D'après l'obtenteur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser deux traitements fongicides mildiou et oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.

## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- [Fiche variétale Voltis](#), INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*