

Brachet N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est particulier au vignoble des Alpes-Maritimes.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Brachet

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Braquet" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Brachet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes à sept lobes avec des sinus latéraux à fond en U et à bords chevauchants, un sinus pétiolaire ouvert, des dents longues à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe bullé, tourmenté, à bords faiblement révolutés, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	11	18	33	6	11	13

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	243	237
Allele 2	133	223	249	182	200	260	254	257	255

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage doit être cultivé dans des terroirs chauds, secs et peu fertiles. Il nécessite une taille courte et un palissage satisfaisant.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Brachet porte le numéro 1365. Des prospections ont été menées récemment dans le vignoble de Bellet (Alpes-Maritimes).

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont de taille moyenne. Les vins de Brachet sont généralement bien appréciés, fins et aromatiques. Cependant leur couleur est souvent insuffisante, c'est pourquoi les rendements doivent être particulièrement limités pour éviter cet inconvénient.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Brachet est très sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*