

Aladin N

Variété d'agrément pour amateurs.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1979 par l'INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le 7489 INRA et le Muscat de Hambourg.

Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

Nom de la variété en France

Aladin

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Aladin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires de couleur vert foncé, à trois, cinq ou sept lobes, avec un sinus pétiolaire à fond en U, peu ouvert ou fermé à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe lisse, légèrement gaufré et involuté, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	229	247	182	192	240	236	235	255
Allele 2	147	236	260	186	202	262	248	243	271

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aladin possède une vigueur moyenne. C'est une variété assez fertile avec un port horizontal. L'Aladin peut être conduit en taille longue modérée et doit être palissé.

Potentialités technologiques

Les grappes de l'Aladin sont moyennes à grosses, moyennement compactes et les baies sont petites à moyennes, juteuses, avec une pellicule épaisse et à saveur simple.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Aladin porte le numéro 5001.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


L'Aladin est peu sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'anthracnose, au black rot et à la pourriture grise mais il doit être greffé.

Phénologie


Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
©2023 Plantgrape, tous droits réservés



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*