

Nouveauté

Ribier noir N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Ribier noir est un cépage traditionnel des vignobles de l'Ardèche et de la Drôme. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, ce cépage est probablement un descendant du Gouais blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Ribier noir

Synonymie

En France, le Ribier noir peut officiellement être nommé "Petit Ribier" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Ribier noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2021 sur la liste A, mais n'est pas encore classée.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanc à liseré carminé, qui présente une densité forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées ou cuivrées, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur rouge ou à stries,
- aux feuilles adultes pentagonales ou cunéiformes, à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux assez profonds avec parfois une dent au fond, un sinus pétioinaire en U ou en V ouvert, à fond souvent limité par la nervure près du point pétioinaire, des dents assez longues, avec un côté concave et un côté convexe, mucronées, une faible pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe mat, plan, finement bullé, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme sphérique.

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	196	244	238	235	261
Allele 2	131	232	249	178	204	260	240	245	271

Aptitudes culturelles et agronomiques

Le Ribier noir est régulièrement fertile, vigoureux et a un port érigé à demi-érigé.

Sélection clonale en France


Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.

Débourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France, (sous le nom de « Petit Ribier »).
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France, (sous le nom de « Rivier »).



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*