

Nouveauté

Négret de la Canourgue N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Négret de la Canourgue est probablement originaire d'Occitanie et traditionnellement cultivé en Lozère et dans les hautes vallées du Tarn et du Lot, en Aveyron.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Négret de la Canourgue

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Négret de la Canourgue est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2025 sur la liste A, mais n'est pas encore classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés, avec une distribution de la pigmentation anthocyanique en liseré,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées, avec une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, cunéiformes, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert à fond en U, les nervures principales adjacentes à la nervure centrale fréquemment soudées à la base, des dents courtes à moyennes, peu nombreuses, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe épais, vert clair, involuté et légèrement tourmenté sur les bords, finement bullé, et à la face inférieure du limbe, une densité moyenne des poils couchés et un faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRAG62	VRAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	137	229	239	172	233	239	238		
Allele 2	149	234	249	178	247	248	247		

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Négret de la Canourgue présente un port demi-érigé, une vigueur moyenne et un aspect effeuillé. Sa production peut être irrégulière. Ses grappes sont compactes et il a tendance à produire beaucoup de grappillons.

Ce cépage est peu sujet à la coulure, mais il est assez sensible au stress hydrique et aux températures élevées. Il était autrefois présent dans les zones où le climat était rigoureux.


Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours avant le Chasselas.

Debourement



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Le Négret de la Canourgue. B. Rande, 1957, Progrès Agricole et Viticole (74) 20-21 p289-294.
- Cépages du Sud-Ouest, 2000 ans d'histoire. G. Lavignac, 2001, Ed. Rouergue/INRA, France.
- Le Négret de la Canourgue : revue bibliographique, J.C. Boulet et O. Yobrégat, 2025, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*