


# Canner seedless B

Variété de raisin pour la conserverie.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1931 par Harold P. Olmo (Californie) en croisant l'Hunisa et la Sultanine.

## Utilisation

Variété de raisin pour la conserverie.

## Nom de la variété en France

Canner seedless

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Canner seedless est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées ou rougeâtres,
- aux feuilles adultes orbiculaires de petite taille, à cinq lobes, avec un sinus pétioinaire peu ouvert à fond en U, des dents petites à moyennes, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe plan, brillant, finement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique longue.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2000	2018
ha	5	0

## Profil génétique

	Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	239	191	188	258	246	216	249	
Allele 2	149	232	239	191	188	262	248	243	273	

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Canner seedless possède une vigueur moyenne à forte et a un port demi-érigé à horizontal. Il doit être palissé et conduit en taille longue.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Canner seedless porte le numéro 975.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes du Canner seedless sont grosses, moyennement compactes. Les baies sont apyrènes, moyennes, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe ferme.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Canner seedless est un peu sensible à l'oïdium, au mildiou et à l'excoriose.

### Débourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier