

Castets N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage du Sud-Ouest (plus particulièrement rive droite de la vallée de la Garonne) pourrait être originaire de la Gironde (environs de Saint-Macaire). D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre le Gros Cabernet et le Camaraou noir.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Castets

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Castets est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles très bronzées et de couleur orangée,
- aux feuilles adultes avec un sinus pétiolaire ouvert en V, des sinus latéraux peu profonds, des dents de longueur moyenne par rapport à leur largeur, à côtés convexes, un limbe fortement bullé, brillant et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et à saveur herbacée.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
ha	57	37	6	2	6

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	239	172	188	246	248	227	239
Allele 2	149	236	243	186	188	248	248	233	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Castets est un cépage vigoureux, peu fertile, qui doit être taillé long. Son débourrement est très tardif et il possède un port érigé.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Castets porte le numéro 1126.

Phénologie

Epoque de débourrement : 14 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses mais les baies sont de petite taille. Ce cépage permet d'élaborer des vins de garde très colorés, relativement alcooliques mais peu acides.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est un peu sensible à la pourriture grise et surtout à l'oïdium. Il est en revanche peu atteint par le mildiou.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*