

# Alicante Henri Bouschet N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété a été obtenue par Louis et Henri Bouschet en 1855 à Mauguio (Hérault) en croisant le Grenache par le Petit Bouschet (Aramon X Teinturier du Cher).

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Alicante Henri Bouschet

## Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Alicante Bouschet" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. En Espagne, l'Alicante Henri Bouschet peut officiellement être désigné "Garnacha tintorera".

## Données réglementaires

En France, l'Alicante Henri Bouschet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Chypre, Espagne, Grèce, Italie et Portugal.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés avec une distribution de la pigmentation anthocyanique en liseré,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes entières avec une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe révoluté, luisant, lisse, dont la pigmentation anthocyanique devient intense à l'automne et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies de forme arrondie et dont la pulpe est colorée,
- aux sarments de couleur générale jaune.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	24168	20563	21996	15769	9393	7104	2460

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	188	244	240	243	249
Allele 2	143	236	243	191	188	258	240	259	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est assez vigoureux mais doit être taillé court car il a parfois tendance à s'épuiser. Il est également assez sensible au vent.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Alicante Henri Bouschet est considéré comme peu sensible à l'oïdium. Par contre, sa sensibilité vis-à-vis du mildiou, de l'excoriose, de la flavescence dorée et de la nécrose bactérienne est assez élevée. Il est également sensible aux maladies du bois.

### Sélection clonale en France

Les quatre clones agréés d'Alicante Henri Bouschet portent les numéros 540, 803, 804 et 805.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et les baies sont de taille moyenne. Ce cépage teinturier est essentiellement utilisé pour son apport de couleur. Les vins obtenus sont assez gras, souvent plats et manquent de finesse et d'élégance.



