

Chasselas rose Rs

Variété de raisin de cuve et de table.



Origine

Cette variété est la mutation rose du Chasselas.

Utilisation

Variété de raisin de cuve et de table.

Nom de la variété en France

Chasselas rose

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Chasselas rose est officiellement désigné par d'autres noms : Chasselas Roxo (Portugal), Chrupka cervena (Rép. Tchèque), Piros chasselas (Hongrie), Rdeca ziahtnina (Slovénie), Roter Gutedel (Allemagne) et Plemanka crvena (Croatie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

Éléments de description

La description correspond à celle du Chasselas, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui dans ce cas, est rose.

En France, le Chasselas rose est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Il est classé en tant que variété de cuve seulement dans certains départements (voir réglementation en vigueur). Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Hongrie, Portugal, République Tchèque, Roumanie et Slovénie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------

ha	55	19	28	86	94	36
----	----	----	----	----	----	----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	131	225	239	182	194	252	240	216	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	141	234	247	186	204	260	254	267	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes du Chasselas rose sont très proches de celles du Chasselas.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Chasselas rose porte le numéro 61 ; il a été sélectionné pour la production de raisin de cuve.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement de cette variété vis-à-vis des maladies est semblable à celui du Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*