Duras N

Variété de raisin de cuve.







Origine

Ce cépage est originaire de la région de Gaillac ou de l'Ariège. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre le Savagnin et le Tressot.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Duras

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Duras est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires à cinq, sept ou neuf lobes, avec des sinus latéraux très profonds, à fond en U et présence assez fréquente d'une dent au fond, avec un sinus pétiolaire à fond parfois limité par la nervure d'un côté près du point pétiolaire, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe tourmenté, révoluté, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	87	75	476	761	949	1063	794

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 137	223	243	176	188	246	238	233	239
Allele 2 149	236	249	186	200	256	248	267	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage de bonne fertilité doit être conduit de préférence en taille courte. Les bois de Duras sont durs et son port est érigé.

Sélection clonale en France

Les quatre clones agréés de Duras portent les numéros 554, 555, 627 et 654. Plus de 120 clones sont conservés depuis 1998 dans le vignoble de Gaillac (Tarn).

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et les baies moyennes. Le Duras a un bon potentiel d'accumulation des sucres. Les vins obtenus sont moyennement colorés mais bien typés (poivrés).


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Duras est assez sensible à l'excoriose, à l'oïdium, aux acariens (surtout au printemps) et à l'eutypiose.


Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés